

QUÈ HE DE **SABER** SOBRE LES PROVES DE **CORONAVIRUS**?

En la situació epidemiològica actual **NO** està recomanat fer proves a tota la població.

Si tens símptomes contacta amb el teu metge de capçalera.

QUAN ESTÀ INDICAT REALITZAR UNA PROVA DE COVID-19?:

- **A tot cas sospitòs d'infecció per COVID-19 i després de ser valorat pel seu metge/esa se li realitzarà una PCR**
- **En grups de població amb major risc de contagi**, per a detectar si han passat l'infecció. Entre aquests grups són d'especial importància el personal sanitari o socio-sanitari així com residents de centres socio-sanitaris (residències de majors, habitatges tutelats, etc.)

QUINS TIPUS DE PROVA ES REALITZEN?

Existeixen diferents proves que em **permeten saber si tinc la malaltia o si la he passat**:

- **PCR o reacció en cadena de la polimerassa**

És la prova que permet fer el **diagnòstic de la malaltia** i per això està indicada quan **apareixen els símptomes** (febre, tos, mal de gola, cansanci, etc.) i sol mantenir-se positiva fins als 10-14 dies des de l'inici dels símptomes. Quan més greu és la malaltia més temps roman positiva.

Es tracta d'una prova molt sensible i específica, que s'analitza en els laboratoris de microbiologia a partir d'una mostra de les secrecions orofaríniques, introduït un hisop per la gola i un altre per la fosa nasal.



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

Què significa una PCR positiva?

Que tinc el virus i puc transmetre la malaltia a altres persones i per tant he de romandre en aïllament i baix seguiment mèdic.

Què significa una PCR negativa?

Que en el moment de la presa de mostres probablement no estava infectat. Però, si tinc símptomes encara he d'estar aïllat i baix seguiment mèdic.

Molt important! Que la PCR negativa no significa que no puga contagiar-me més endavant.

- **Tests ràpids de detecció d'anticossos (Ac)**

Amb aquests tests es pot detectar **si hem tingut contacte amb el virus i hem desenvolupat anticossos** (defenses). Aquestes proves busquen detectar la resposta immune, la qual augmenta segons avança l'infecció.

La seua utilització **complementa a la de la PCR**, ja que els anticossos comencen a produir-se a partir del 6^o dia de l'inici dels símptomes i als 15 dies quasi el 100% tenen anticossos, tant en els casos lleus com en els greus. Per aquest motiu, els tests ràpids en aquests moments no són útil per al diagnòstic clínic de la malaltia.

L'avantatge que tenen és que permeten obtenir **resultats ràpids** en 15 minuts, a partir d'una punxada en el dit amb una llanceta i tenen un format **fàcil d'utilitzar** pel personal sanitari.

Què significa un test d'Ac positiu?

Que he tingut contacte amb el virus i he desenvolupat anticossos però pot ser que l'infecció no estiga resolta i en aquest cas cal confirmar-ho amb una altra prova per indicació facultativa.

*(Esta fitxa s'ha elaborat a partir de la informació emanada de les distintes autoritats sanitàries del nostre país i de la nostra comunitat autònoma, i té vigència des del 21 de maig de 2020)



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública